



**Código: 6/233**

**Título: Causa infrecuente de dolor abdominal; Carcinoma suprarrenal**

**Autores:**

1. María del Pilar Sánchez Sánchez. MIR 3er año de MFyC.
2. Henar Gómez Galera. MIR 3er año de MFyC.
3. Cristina Góngora Beltrán. FEA de MfyC.

## Caso Clínico

**Palabras claves: carcinoma suprarrenal, masa abdominal**

Motivo de consulta: Dolor abdominal

Enfoque individual: **Mujer de 57 años** con antecedentes de dislipemia y fibromialgia, colecistectomizada, en tratamiento con Simvastatina 20 mg, que acude a su Centro de Salud por **dolor en hipocondrio derecho de 2-3 meses de evolución**. El dolor ha empeorado durante las últimas dos semanas. En la exploración física destaca **masa abdominal** en cuadrantes derechos abdominales, indurada.

Juicio clínico: Carcinoma intraabdominal, colédocolitiasis.

Plan de acción: Se pide análisis de sangre y se realiza ecografía abdominal en la consulta, donde se visualiza tumor suprarrenal. Ante estos hallazgos, el paciente acude a Urgencias hospitalarias, en **ecografía** reglada se objetivan los siguientes hallazgos : Hígado de tamaño normal, sin dilatación de la vía biliar intrahepática. Se aprecian varias lesiones ocupantes de espacio, nodulares, algunas hipoecogénicas y otras isoecogénicas, sólidas, en el lóbulo caudado, lóbulo hepático izquierdo y segmento 5/6, siendo la de mayor tamaño de 68 mm. El nódulo del lóbulo caudado comprime la vena cava inferior. En localización suprarrenal derecha, se aprecia masa de gran tamaño, de 95 mm en su eje máximo, con contornos lobulados, que no depende del parénquima hepático ni del riñón. Aspecto heterogéneo, que impronta sobre el lóbulo hepático derecho. La masa tiene un comportamiento hipovascular y presenta calcificaciones groseras en su interior. Porta y colédoco de calibre normal. Paciente colecistectomizada. Páncreas, bazo, riñones y vejiga sin alteraciones de interés. Sin líquido libre intraabdominal ni otras colecciones. **Masa suprarrenal derecha, de características malignas, en relación con probable carcinoma suprarrenal.**

Conclusiones: El carcinoma suprarrenal es un tumor poco frecuente que suele presentarse como una masa de gran tamaño con tendencia a invadir las estructuras vecinas o por una variedad de síndromes hormonales como el hipercortisolismo y la virilización. El diagnóstico se fundamenta en las técnicas de imagen.

