

Código: 9/112

Titulo: Desafío diagnóstico en Atención Primaria:

caracterización ecográfica de una masa hepática heterogénea

Autores: Mariana Gabriel Díaz Oreste (R1 MFyC), Gabriel Nogales Garcia médico de urgencias HARE Écija, Salvador Jimenez Ortega (Médico especialista MFyC)

Caso Clínico

Motivo de consulta: analítica de revisión y pérdida de peso en los últimos meses

Historia clínica:

- **AP:** hombre de 77 años, No RAMc, no hábitos tóxicos. HTA, DLP, DM-2, quiste renal derecho, no IQX, funciones superiores conservadas.
- **Exploración:** aceptable estado general, consciente, normohidratado, normocoloreado. Abdomen blando, no distendido, depresible, no doloroso, no peritonismo, ruidos hidroaéreos conservados, no masas, no megalias, no estigmas de hepatopatía crónica ni ascitis, no cicatrices.
- **Ecografía consulta:** hígado de ecogenicidad heterogénea, límites irregulares, imagen hipoecoica heterogenea de límites mal definidos de 13cm en polo inf. No visualizables adenopatías por abundante gas intestinal. Resto normal.

Foto 1



Foto 2



Derivación al servicio de urgencia, sospecha NEO hepática/MTX:TC abdomen con contraste: lesión de márgenes mal definidos en hipodensa en cola pancreática de 33x29mm, compatible con adenocarcinoma. Infiltración tumoral de la vena esplénica. Pequeñas adenopatías subcentrímetricas en ligamento gastrohepático. Hepatomegalia con múltiples lesiones hipodensas, mal definidas y milimétricas de predominio en la periferia de segmentos V, VIII y LHI. Probables metástasis, la mayor de 14mm en S. VIII-

Foto 3



Enfoque familiar y comunitario: Situación basal: mínima dependencia.

Juicio clínico: Síndrome constitucional. Masa hepática sospechosa de malignidad

Estudio molecular: KRAS G12X. Carcinoma con expresión conservada de proteínas reparadoras de ADN.

Tratamiento: quimioterapia. NET IIIB

Conclusión

La ecografía, como complemento de una entrevista y exploración completas, es una herramienta muy eficiente y sensible para el estudio de pacientes con síndrome constitucional en Atención Primaria, **reduciendo la incertidumbre del Médico de Familia y permitiendo el diagnóstico precoz.**