

Código: 9/123

Título: Detección de adenocarcinoma pancreático avanzado mediante ecografía clínica en atención primaria: valor de la accesibilidad diagnóstica

Autores: José María Conchilla Parrilla¹, Sergio Ortega Pérez², Yolanda Maldonado Balbín¹

¹ Médico de Familia en C.S Torredelcampo


² Médico Residente en Medicina Familiar y Comunitaria en C.S Torredelcampo

Caso Clínico

Mujer de 69 años que consulta por molestias abdominales, dolor epigástrico irradiado a espalda, náuseas, coluria intermitente y pérdida ponderal no intencionada de 7 kg en 2 meses. Antecedentes relevantes incluyen hipertensión arterial y diabetes mellitus tipo 2 recientes, colecistectomía, anemia microcítica en estudio y trastorno ansioso-depresivo. En la exploración se detectó dolor epigástrico con irradiación dorsal, abdomen distendido y sin signos de irritación peritoneal.

Pruebas complementarias

- Marcadores tumorales elevados: CA 125 (109 U/mL), CA 19.9 (53.1 U/mL)
- Enzimas hepáticas alteradas progresivamente (AST, ALT, GGT)
- Bilirrubina total aumentada (predominio directa)
- Ecografía clínica: masa hipoecogénica irregular de 37x38 mm en cabeza/proceso uncinado pancreático, múltiples lesiones metastásicas hepáticas bilaterales, dilatación de vía biliar intra y extrahepática (colédoco 18 mm) y dilatación del conducto de Wirsung.
- Punción aspirativa con aguja fina (PAAF) pancreática confirmatoria: adenocarcinoma pancreático con 40% de celularidad tumoral.



Diagnóstico

Adenocarcinoma pancreático de cabeza, estadio IV, con metástasis hepáticas y pulmonares.

Evolución y tratamiento

La paciente ingresó en Medicina Interna, donde se colocó prótesis biliar por CPRE y se inició tratamiento oncológico con FOLFOX. Posteriormente desarrolló complicaciones tromboembólicas (tromboembolismo pulmonar derecho y trombosis portal, mesentérica superior y esplénica), siendo anticoagulada con dabigatrán.

Conclusiones

- La ecografía clínica es una herramienta diagnóstica fundamental en Atención Primaria para detección precoz neoplasias pancreáticas.
- La combinación de síntomas clínicos y alteraciones analíticas debe alertar sobre la sospecha de adenocarcinoma pancreático.
- El diagnóstico precoz permite un inicio temprano del tratamiento oncológico y mejora la coordinación del cuidado.