

Código: 9/135

Titulo: Diagnóstico ecográfico de metástasis hepáticas de tumor primario desconocido en paciente séptico

Autores:

Utor García, Luis (1); Hernández Miras, Diego (2); Ruz Franzi, Ignacio (3)

(1) Residente MFyC del CS Olivillo (Cádiz)

(2) Residente MFyC del CS Olivillo (Cádiz)

(3) Especialista en MFyC del CS Olivillo (Cádiz)

Caso Clínico

Antecedentes personales: Mujer de 65 años con oligofrenia, dependiente para las actividades básicas. Antecedentes de hipertensión arterial, dislipemia, hipotiroidismo y fibrilación auricular en tratamiento crónico. Sin antecedentes oncológicos conocidos, aunque familiares refieren elevación previa de marcadores tumorales sin estudio posterior.

Motivo de consulta: Acude a Urgencias por fiebre de varios días, decaimiento, somnolencia y dolor abdominal difuso.

Exploración física: Paciente febril (38,5 °C), con tendencia a la hipotensión (TA 95/60 mmHg) y taquicardia irregular. Abdomen doloroso de predominio en hipocondrio derecho, sin signos de irritación peritoneal.

Pruebas complementarias: Analítica con leucocitosis (17.000/ μ L) y PCR elevada (150 mg/L).

Se realiza ecografía abdominal que muestra hígado heterogéneo con múltiples imágenes hipocogénicas compatibles con **metástasis hepáticas**, sin visualizar masa primaria. Resto de órganos sin alteraciones significativas.

Juicio clínico: Sepsis de probable origen abdominal en paciente con hallazgos ecográficos sugestivos de metástasis hepáticas sin primario conocido.

Plan de actuación: Fluidoterapia, antibioterapia empírica de amplio espectro y derivación a Medicina Interna, donde se confirma el diagnóstico y se inicia tratamiento de soporte. Dada la situación basal y el contexto familiar, se acuerda manejo paliativo y valoración multidisciplinar.

Conclusiones: La ecografía a pie de cama en Urgencias resultó determinante para orientar el origen infeccioso y neoplásico, favoreciendo una toma de decisiones ética, centrada en la paciente y su entorno.

