10as JORNADAS ANDALUZAS DE ECOGRAFIA SAMFyC
SAMFyC Sociedad Andaluza de Medicina Familiar y Comunitaria
CABRA (Córdoba)
24 OCTUBRE
HOTEL FUENTE LAS PIEDRAS
2026

Código: 10/124

Título: COLANGITIS AGUDA ASOCIADA A VESÍCULA EN GORRO FRIGIO: EL VALOR DE LA ECOGRAFÍA CLÍNICA A PIE DE CAMA EN LOS SÍNDROMES COLESTÁSICOS

Caso Clínico

ÁMBITO DEL CASO

Urgencias Hospitalarias

MOTIVO DE CONSULTA

Dolor abdominal y vómitos

ENFOQUE INDIVIDUAL

Anamnesis

Mujer de 71 años con DM2, HTA, obesidad, dislipemia, asma y enfermedad de Parkinson (polimedicada). Dolor paulatino en epigastrio e HCD. Valorada dos veces de forma sintomática, sin imagen; reconsulta a las 48 h por persistencia del dolor y los vómitos.

Exploración física

Estable, eupneica y afebril. Abdomen blando y globuloso, dolor selectivo en epigastrio e HCD. Murphy clínico negativo y sin peritonismo.

Pruebas complementarias

Analítica: leucocitos 11.630/µL con neutrofilia; PCR 147 mg/L. Bilirrubina total 5,32 mg/dL (directa 5,08), GGT 1133, FA 479, AST 712 y ALT 495 U/L.

PoCUS: esteatosis hepática y vesícula distendida, con acentuada angulación del fondo compatible con vesícula en gorro frigio. Murphy ecográfico negativo y sin dilatación biliar.

Durante el ingreso aparece **ictericia** y **fiebre** hasta 38,1 °C; hemocultivos: E. coli multisensible.

Colangio-RM: colédoco 3 mm, sin defectos intraluminales ni coledocolitiasis persistente.



ENFOQUE FAMILIAR Y COMUNITARIO

Vive sola e independiente para las ABVD. Cuenta con sólida red de apoyo familiar. Hijo es su cuidador principal.

JUICIO CLÍNICO

Colangitis aguda grado I, secundaria a probable coledocolitiasis. Vesícula en gorro frigio.

PLAN DE ACCIÓN

Ingreso en planta inicialmente en Medicina Interna, luego en Cirugía.

EVOLUCIÓN

Excelente respuesta antibiótica e hídrica. Afebril desde el tercer día, con resolución de epigastralgia e ictericia.

CONCLUSIONES

- PoCUS acorta el tiempo diagnóstico y permite sospechar colangitis obstructiva aun sin dilatación biliar inicial.
- La vesícula en gorro frigio es una variante anatómica frecuente.